



洗腎患者副甲狀腺素血中濃度 異常之治療

- ✓ 洗腎患者之高血磷症狀易導致副甲狀腺素濃度異常
- ✓ 副甲狀腺素濃度異常會增加病人之死亡率，並導致骨病變和心血管疾病風險增加。
- ✓ 國際指引建議定期監控洗腎患者之血中鈣、磷和副甲狀腺素濃度，並透過藥物和飲食控制血中濃度在建議範圍內。

洗腎患者副甲狀腺素濃度異常之治療:

1. 需要降低副甲狀腺素濃度的洗腎患者

→ 建議使用**擬鈣劑(calcimimetics)**搭配活性維生素D (calcitriol)或維生素D類似物，或三者單獨使用。

(擬鈣劑可降低副甲狀腺素血中濃度，並伴隨血中鈣質降低)

2. 內科藥物治療無效後

→ 可考慮進行副甲狀腺切除術

聲明：本衛教資訊內容僅供參考，無法取代醫師之診斷與治療，治療方式之評估請洽詢專業醫師。

參考資料: 1. Kidney International (2024) 105 (Suppl 4S), S117–S314
2. Kidney International Supplements (2017) 7, 1–59
3. 台灣慢性腎臟病臨床診療指引



更多血液透析
健康衛教資訊